



Merkblatt Würmer (Oxyuren)

Symptome

- starker Juckreiz
- manchmal Bauchschmerzen
- ca. 1 cm lange weiße Würmer im Stuhl

Ursache

Über verunreinigtes Obst oder Gemüse werden die Larven aufgenommen.

Auch eine Übertragung durch die eigenen Finger ist möglich, da die Wurmeier unter den Fingernägeln hängen bleiben können.

Die Larven wandern durch den Darm und entwickeln sich zu Würmern.

Diese setzen nachts in der Region um den After herum Eier ab.

Dadurch entwickelt sich der typische Juckreiz.

Diagnostik

- Sie bekommen einen durchsichtigen Objektträger, sowie eine dazugehörige Plastikhülle.
- Kleben Sie morgens einen durchsichtigen Tesafilmstreifen auf die Analregion, drücken Sie diesen fest und ziehen Sie ihn vorsichtig wieder ab.
- Diesen Tesafilmstreifen kleben Sie danach auf den Objektträger.
- Packen Sie dann den Objektträger in die Plastikhülle und verschließen Sie diese.
- Wenn mehrere Familienmitglieder untersucht werden, beschriften Sie die Proben bitte.
- Die Diagnostik im Labor dauert 2-3 Tage.

Therapie

Die Behandlung erfolgt in unserer Praxis mit dem Wirkstoff Pyrantel, das Medikament heißt Helmex.

Unter 12 kg:	Helmex Sirup	38 – 51 kg:	500 mg
12 – 16 kg:	125 mg	51 – 63 kg:	625 mg
16 – 26 kg:	250 mg (1 Kautablette)	63 – 76 kg:	750 mg
26 – 38 kg:	375 mg	über 75 kg:	1000 mg (Höchstdosis)

Wir empfehlen, die Behandlung nach 2 Wochen zu wiederholen.

Bestehen danach immer noch Symptome, wird der Test mit dem Tesafilmstreifen wiederholt.

Hygienemaßnahmen

- Fingernägel kurz schneiden (Übertragung erfolgt oral/fäkal)
- Regelmäßig Hände waschen
- Jeden Tag Unterwäsche wechseln
- Bettwäsche waschen (mindesten 60° Celsius)

Tritt keine Besserung ein. Wiedervorstellung in der Praxis